

Informativa test su tampone per la ricerca di SARS-CoV-2

Per la ricerca e quantificazione della presenza dell'RNA virale di SARS-CoV-2 (diagnosi) le verrà effettuato un TAMPONE RINO-FARINGEO (nasale). Il tampone nasale è un protocollo che prevede il prelievo di cellule superficiali della mucosa della faringe posteriore e della rinofaringe, mediante un idoneo tampone (bastoncino) in grado di trattenere il materiale biologico su cui si effettuerà poi l'analisi. Il tampone sarà sottoposto alla procedura di estrazione dell'RNA virale che, successivamente, verrà quantificato mediante un metodo di amplificazione noto come "RT-PCR (Polymerase Chain Reaction)".

Il test su tampone è un test diagnostico in grado di rilevare la presenza o meno, al momento dell'effettuazione del tampone stesso, del SARS-CoV-2 verificando nel soggetto stesso la presenza di infezione e contagiosità.

Nel caso di POSITIVITA' al tampone, come da direttive Nazionali e di Regione Lombardia, il soggetto è obbligato a riferire l'esito di positività al proprio medico di Medicina Generale sottoponendosi immediatamente ad isolamento domiciliare per impedire la diffusione del virus.

Nel caso di NEGATIVITA' al tampone è possibile escludere, al momento dell'effettuazione del tampone stesso, la presenza di infezione da SARS-CoV-2 per cui il soggetto è non contagioso. Non è possibile, visti i tempi di latenza nell'espressione dell'infettività a SARS-CoV-2 circa 10 giorni, che il soggetto possa potenzialmente diventare infetto e contagioso in un lasso di tempo come sopra descritto.